

徳島県内訪問看護ステーションでの管理方法 徳島県下の訪問看護ステーションでの一例です

	感染対策	T 訪問看護ステーション	A 訪問看護ステーション
テル管理 中心静脈カテー	挿入部の消毒方法	イソジン消毒を行う	水道水をつけた綿棒で清拭後、アルコール綿で消毒を行う
	挿入部の保護材	滅菌ガーゼと滅菌透明フィルムを使用	リードクッキングペーパーを使用 未滅菌透明フィルムを使用
	交換頻度	1回/週（ルートのみ）	1回/2週（ルートのみ）
C Vポ ート管理	挿入部の消毒方法	アルコール綿で清拭後、イソジン消毒を行う	清拭後、個包装アルコール綿を3枚以上使用し、消毒を行う
	挿入部の保護材	滅菌ガーゼと滅菌透明フィルムを使用	リードクッキングペーパーを使用 未滅菌透明フィルムを使用
	交換頻度	1回/週	1回/2週
人工呼吸器管理	人工呼吸器回路の管理	ディスポーザブル回路を提供する業者が担当している	ディスポーザブル回路を提供する業者が担当している
	気管カニューレの人工鼻の交換頻度	1回/日～1回/2日交換 （機種により異なる）	1回/日～2回/日交換 （機種により異なる）
	フレックスチューブの消毒	0.01%ミルトン液に浸漬する	食酢で消毒、または水洗い
吸引方法・管理	チューブの交換	気管内 1回/日～3回/週 口腔内 1回/日～1回/2週 （口腔内は気管内使用後を再使用）	気管内 1回/日 口腔内 1回/日～1回/2週適宜 （口腔内は気管内使用後を再使用）
	再使用時の方法	アルコール清拭後空容器に保管もしくは、0.01%ミルトン液に浸漬する	十分な水道水で流した後、アルコール綿で拭き、チューブが入っていた袋に入れて保管する
	個人防護具	使い捨て手袋着用 撮子使用時はアルコール綿で消毒	看護師は使い捨て手袋着用 家族はアルコール手指消毒のみ
Iテル管理 自己導尿カテ	チューブの交換	毎回交換する	毎回交換する
	挿入時の消毒	市販のおしり拭きを使用	市販の洗浄綿またはおしり拭きを使用
胃ろう管理	周囲の管理	周囲を微温湯で洗浄する	水道水で濡らした綿棒で挿入部や肉芽をしっかりとこする
	酢水によるカテーテルロック	行っている	行う場合もある